



(51) МПК
A61K 36/02 (2006.01)
A61N 5/067 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21)(22) Заявка: 2014147260/15, 24.11.2014

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
 24.11.2014

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 24.11.2014

(45) Опубликовано: 20.11.2015 Бюл. № 32

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: RU 2460491 C2 10.02.2012. RU 2216365 C1 20.11.2003. RU 2184580 C1 10.07.2002. RU 2230464 C1 20.06.2004. RU 2539191 C1 20.01.2015. ГУДКОВ А. Б. "Влияние раствора ламинарии на твердые ткани зубов и пародонт при проведении профилактики у курсантов мореходного училища"//Ж: Экология человека, 2001-№3-с.14-15.

Адрес для переписки:

450077, г. Уфа-центр, ул. Ленина, 3,
 БАШГОСМЕДУНИВЕРСИТЕТ, патентный
 отдел

(72) Автор(ы):

Хайбуллина Расима Рашитовна (RU),
 Гильмутдинова Лира Талгатовна (RU),
 Герасимова Лариса Павловна (RU),
 Сорокин Александр Петрович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Государственное бюджетное
 образовательное учреждение высшего
 профессионального образования
 "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
 Министерства здравоохранения Российской
 Федерации (RU)

(54) СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕЛЯ ЛАМИФАРЕН

(57) Формула изобретения

Способ лечения пародонтита, включающий введение в пародонтальные карманы верхней и нижней челюстей геля водорослевого происхождения, последующее воздействие лазерным излучением длиной волны 662 нм, режим - непрерывный, отличающийся тем, что в качестве геля водорослевого происхождения используют гель «Ламифарен», который вводят в пародонтальный карман в количестве 0,2-0,3 г, через 15 минут проводят облучение, используя точечную насадку, мощностью излучения 0,4 Вт, плотностью энергии 18-20 Дж/см², экспозицией 15-30 секунд на каждый карман, затем на десневую поверхность, не удаляя остатки геля, накладывают лечебную повязку «Септопак» на 4 часа после каждой процедуры, курс лечения составляет 4 ежедневные процедуры: по 2 процедуры поочередно на верхнюю и нижнюю челюсти, кроме того, дополнительно назначают «Ламифарен» перорально за 20-30 минут до еды, по 60 г 3 раза в день в течение 30 дней.